

XILOCA 21
págs. 187-198
1998
ISSN: 0214-1175

APROXIMACIÓN A UNA COMUNIDAD DE AVES EN UNA ZONA DEL ALTO JILOCA

José M^a Cereza Abadías*

Resumen.– Descripción de algunas especies de aves existentes en el Alto Jiloca, principalmente entre la zona de Ojos Negros y Villar del Salz, con indicación de sus características, intensidad de presencia y reproducción, así como en las partidas donde suelen habitar. Se complementa el estudio con una amplia reproducción fotográfica de la misma.

Abstract.– Description of birds species in Alto Jiloca mainly between Ojos Negros zone and Villar del Salz, with explaining of its features, presence, intensity and reproduction as well as the places where they get used to live. The study is finished with a whole photography reproduction of different matters.

En el presente artículo, vamos a intentar el describir una relación lo más completa posible, de todas las especies de aves que vamos a poder ver en una zona determinada del Alto Jiloca, concretamente en el término municipal de Ojos Negros y algunos términos vecinos como son los de Villar del Salz, Pozuel, Blancas, etc.

Diremos que es una aproximación por cuanto por un lado no es una lista cerrada, puesto que nuevas especies que se visionen se podrán añadir a ésta, tampoco va a ser una lista completa, pues es posible que alguna especie que por estos términos haya pasado, no se tenga constancia de su paso por no detectarla personas entendidas.

* Veterinario y naturalista.

Será pues una base de partida acerca de las diferentes especies, de aves que podremos encontrar ya de paso ya como reproductores en esta zona del Alto Jiloca con centro en el pueblo de Ojos Negros. Ni que decir tiene que los diferentes biotopos o hábitats que encontremos en estas tierras serán definitorios de cara a las especies que ligadas a ellos vamos a describir, es por ello que nos detendremos en la descripción de estos medios naturales, cobijo de aves, enclavados en esta parte de la provincia de Teruel. Los *medios húmedos* van a estar casi ausentes puesto que ni lagunas, ni sotos, ni ríos van a estar presentes en la zona de estudio, encuadrando en este biotopo las muy numerosas balsas que acumulan agua de la lluvia (Los Ramblares, El Anillo, Solacuerda, La Pajaranca, etc.) y sirven de bebida para el ganado. Alguna rambla y alguna chopera en zonas de encharcamiento (Las Salinas, Ojo de Mierla) entrarían en este apartado y como consecuencia de todo esto tendremos una pobreza de "especies de agua" es decir anátidas y limícolas. La Laguna de Gallocanta a unos 30 km, los Ojos del Jiloca en Monreal del Campo a unos 15 km y la laguna de Setiles a unos 20 km serán las zonas húmedas de cierta importancia en los alrededores de la zona de estudio, que pueden contribuir al acercamiento de determinadas aves que en esos puntos recalen.

El *medio estepario* quizás va a ser el medio "rey" en Ojos Negros y las especies ligadas a él, las más abundantes. Amplios campos de cereal con cercanas parameras, tablas yermas, barbechos, relieves alfombrados de estepas, aliagas, romeros, tomillos, espliegos dotarán de un aroma especial a estos lugares cuando caminemos por ellos.

El *medio mediterráneo* o biotopo mediterráneo también va a ser abundante en estos parajes. La encina, llamada aquí "chaparro" formará algún bosque disperso que podría hacerse maduro de no existir la ancestral costumbre de la adjudicación de lotes anuales ("suertes de leña") en base a la corta de encinas quedando la curiosa imagen de los "resalbos" (palos marcados de un grupo de matas de encinas que hay que dejar) dispersos en el monte tras la adjudicación anual de la zona de leña. Aún así contaremos con lugares como "El Tajadal", "Traslabalsa", "Peña Rubia", con carrascales mas espesos y no muy lejos en la zona de la Fuente de los Villares, en el término de Pedregal, podremos encontrar unos magníficos ejemplares de encinas de... muchos años de edad.

En las faldas de Sierra Menera, lugar donde estaban y están ubicadas las explotaciones mineras a cielo abierto que cerraron en 1987 el bosque se ha desarrollado a sus anchas pudiendo encontrar encinas junto con robles y quejigos creando en según que zonas espesuras casi impenetrables.

El *medio rupícola* también aportará especies de aves, medio que estará representado por cortados, peñas, pedregales, ramblas, así como los taludes de las minas antes aludidas. "Peña Rubia", "Los Castillejos", "La Rambla de las Salinas", "El Mortero", "Carravillar" serán hitos de este tipo de biotopo junto con los pozos de "Herrera", "Montiel", "Corral" en las minas de Sierra Menera.

El *bosque caducifolio y de coníferas* va a estar ausente en la zona de estudio teniendo cercanos los pinares de la zona de Peracense-S.Ginés, Setiles, El Pobo y más lejanos los magníficos y espesos pinares de los Montes Universales que poseen-

rán especies de aves típicas de pinar que casi no describiremos en el término de Ojos Negros pero que de "un vuelo" en algunos casos se podrán acercar a la zona descota. Añadiremos a esta descripción de los biotopos que Ojos Negros esta situado en las faldas de Sierra Menera (Sistema Ibérico Castellano-Aragonés) a una altura de 1.151 metros s.n.m., sierra que aporta las mayores alturas del término municipal (Alto del Lobo y cerro del Aguila con mas de 1.500 m) y éste continúa en sus límites con Monreal y Villafranca con la meseta turolense por excelencia situada por los 1.000 m de altitud.

Una vez vistos los diversos biotopos que podemos encontrar en la zona de estudio, vamos a entrar en la descripción de los diferentes grupos de aves con algún comentario al respecto, antes de relacionar en lista todas las aves vistas u oídas en esta zona del Alto Jiloca.

Anatidas y limícolas: Ya hemos comentado que no es precisamente este grupo de aves el más común en este estudio. Las aves relacionadas con medios acuáticos no abundarán en paisajes aparentemente secos, aún así el anade real cría, la polla de agua crió cuando el Ojo de Mierla poseía agua de continuo, y también se ha avistado cerceta común.

Entre los limícolas es fácil ver en los balsetes andarrios chico e incluso alguna agachadiza común, habiéndose también visto, chorlito carambola, chorlitejo chico, avefría, chorlito dorado (hay un ejemplar disecado abatido en la zona). Igualmente citaremos al rascón, gaviota reidora, zampullín chico (en época de paso) y alguna cigüeña común que recalca temporalmente en la zona y, como no, las grullas que, viniendo de la cercana Laguna de Gallocanta, se alimentan en los campos de cultivo repartidos por todos estos pueblos, principalmente de Ojos Negros y Blancas.

Rapaces: Los buitres si bien no crían en la zona se ven habitualmente en el Alto Jiloca. La abundancia de ganado ovino en Ojos Negros hace que estas rapaces incluso duerman en el término, esperando el cadáver de la oveja de turno para "limpiar". Alimoche se le ve esporádicamente y de las águilas está ausente la perdicera. El aguila real mantiene una buena población en el Alto Jiloca y el águila culebrera y la calzada crían en la zona pero escasamente.

Un mes de septiembre de hace unos años observé un águila pescadora posada en un poste telefónico, cerca del barrio centro de Sierra Menera, lógicamente estaba de paso y el buteo o ratonero también se detecta en alguna ocasión. Los milanos negros y real son vistos habitualmente produciéndose importantes concentraciones de estas rapaces en las choperas aledañas a Monreal del Campo. El azor y el gavián hacen incursiones en el monte de Ojos Negros, desde los pinares que rodean esta zona y los aguiluchos cenizo y pálido, el primero reproductor y el segundo invernante cazan por las grandes extensiones de campos de cereal. El halcón peregrino está presente en la zona, acompañado del alcotán y el cernícalo común quizás va a ser la rapaz más abundante en Ojos Negros. El esmerejón se detecta en invierno y cerca de Ojos Negros, en el vecino pueblo de el Pobo de Dueñas (provincia de Guadalajara). Pude observar durante un buen rato en un septiembre una pareja de elanos azules, siendo de las escasas observaciones de esta rapaz en esta parte peninsular.



El buitre leonado es inquilino habitual del Alto Jiloca.



La perdiz sigue manteniendo buenos efectivos en estas tierras.



La chova piquirroja se detecta en cortados rocosos y en masadas abandonadas.

De las rapaces nocturnas tenemos presencia y cría de buho real, buho chico, mochuelo, autillo, lechuza común y en épocas de paso se puede ver lechuza campestre.

Aves de caza (galliformes y columbiformes): En la zona de estudio abundan la perdiz roja, la codorniz, la paloma torcaz, la tórtola y la paloma bravía. Estas especies sufren una fuerte presión cinegética todos los años dependiendo el éxito de su reproducción de condiciones climáticas y alimenticias que influyen decisivamente en el mantenimiento de sus poblaciones.

Aves esteparias: Incluiremos dentro de esta denominación a varias familias de aves científicamente llamadas Otidae (avutardas y sisonas) Burhinidae (alcaraván) Pteroclididae (ortegas) y Alaudidae (alondras, terreras, etc.) pues en conjunto van a ser un grupo de aves que van a ocupar un biotopo común, abundante, por otra parte, en esta área, cual va a ser el medio estepario. Las avutardas muy escasas en el Jiloca, de verse es de paso y esporádicamente (en 1989 pasaron por Ojos Negros 14 ejemplares en período postnupcial en el mes de agosto), el sisón igualmente es escaso y el alcaraván abunda más siendo la ortega o "turra" el ave esteparia emblemática en estos términos. Del resto de esteparias citaremos a la alondra cogujada común y montesina, terrera común y marismeña, calandrias, y se poseen dudas acerca de la reproducción de la alondra de Dupont, cuyo inconfundible reclamo se detecta en la zona de "Las Monjas" y "Los Cerritos" en el término de Ojos Negros.

Vencejos y golondrinas: Dentro de estas familias Apodidae, vencejos e Hirundinidae, aviones y golondrinas, citaremos la presencia de vencejo común, avión



El popular pineón común es conocido en estas tierras como "Nevador".

roquero, el cada vez más escaso avión común y, de paso, se puede detectar el vencejo real de inconfundible pechera blanca.

Cucos chotacabras, picos y abejarucos: En esta peculiar agrupación entrarán las familias Cuculuidae, cuco y crialo, ambos presentes en la zona, Caprimulgidae, chotacabras gris y pardo o como son bien conocidos en estas tierras "gallinas ciegas", Meropidae, cuyo representante va a ser el abejaruco, al que se ve de paso. Upudidae, familia cuyo representante es la abundante abubilla, Picidae, en la que nos encontramos a los pájaros carpinteros y cuyos representantes en la zona de estudio van a ser el pito real y el pico picapinos, con reproducción comprobada del primero y dudosa del segundo. Dentro de esta agrupación y emparentada con los abejarucos, esta la carraca (familia coracidae), ave de preciosos colores que recientemente detectamos en el término de Monreal del Campo. Se trataba de un ejemplar joven el pasado mes de agosto. Esta cita tiene su importancia pues es la carraca una especie que está en expansión desde sus áreas normales de distribución en el centro y sur peninsular.

El resto de especies que nos quedan por citar se van a encuadrar, científicamente hablando, en un gran cajón de sastre que llamamos genéricamente "Pájaros" o mejor dicho orden "Paseriformes", este orden es el mayor de las aves tanto en número de especies como en individuos, viviendo en todo tipo de hábitat. Son de tamaño mediano a pequeño, teniendo los pies con tres delante y uno detrás. De identificación en muchos casos difícil, tendremos que estar atentos a los cantos y reclamos que nos serán muy útiles en el reconocimiento de las especies en caso de no verlas. En las descripciones anteriores ya hemos extraído a los vencejos, aviones, alondras, terre-

ras, cogujadas, etc., que son de este orden pero que venía bien el encuadrarlos en otros epígrafes, continuaremos con los propios de esta gran agrupación.

Córvidos: Los conocidos como “grajos” tienen la peculiaridad de que para todo el mundo son “negros”, pues ante el color uniformemente negro de su plumaje tenemos que identificarlos o por el pico, o por el reclamo, o por características de tamaño o hábitat. El cuervo será la especie mas grande con robusto pico y cola en suelo en forma de rombo. La corneja, de fácil confusión será algo más pequeña, ocupando zonas más llanas o menos agrestes. Su pico será más pequeño que el del cuervo y la cola en vuelo cuadrada. La chova piquirroja cuyo nombre lo dice todo, estará presente en los roquedales de la zona, criando igualmente en las masadas dispersas por el campo. La grajilla, negra igualmente, será más pequeña y con los bordes de la cabeza de color cenizoso. La picaraza o urraca será abundantísima y más escaso el arrendajo que lo encontraremos en zona de denso arbolado sobre todo en la Sierra Menera. Sin ser córvidos traeremos a este epígrafe a los estorninos, negro y pinto, reproductor uno e invernante el otro, por englobar en su conjunto a todas estas especies tan denostadas en general por los habitantes de la zona.

Resto de especies: Citaremos aquí el resto de familias dentro del orden Paseriformes, lo que supone aproximadamente unas 60 especies de pájaros, que no enumeraremos en su totalidad pues nos remitimos a la lista de los mismos al final del artículo.

La familia Paridae está escasamente representada en la mayor parte de la zona de estudio, si bien citaremos al carbonero común y herrerillo y en zonas arboladas de



El roquero rojo es raro en el Alto Jiloca.



Imagen de una carraca (1^o observación para la zona) de este pasado verano (1997) entre Monreal y Ojos Negros.

la sierra o en la proximidad de pinares veremos u oiremos reyezuelos, mito, carbone-ro garrapinos.

La familia muscicapidae es la que aporta más especies dentro de ese orden, en esta parte de la geografía turolense, destacaremos al mirlo común, zorzales común y charlo, petirrojo, tarabilla común y norteña, curruca (hasta 6 especies: carrasqueña, rabilarga, zarcera, tomillera...), colirrojo tizón y en paso el real, zarcero, mosquiteros común, musical y papialbo, papamoscas gris... destacando sobre todos las collalbas muy comunes y conocidas en la zona. Así la collalba gris, que se llama por los lugares "zorribalba", la collalba rubia llamada "zorribalda marina" (impresionante y enigmático nombre) y muy escasa la collalba negra. También citaremos que en época de migración se ha visto bebiendo en los balsetes de la zona al pechiazul, especie de cría lejana a estas tierras.

La familia motacillidae tiene como representantes a la lavandera blanca (engañapastor), lavandera boyera, bisbita ribereño y campestre. La familia Lanidae a los alcaudones real y común, verdaderas "rapaces" de los pájaros, destacando la observación del verano pasado en el cercano Villar del Salz de un alcaudón dorsirrojo, especie nada común en la zona.

Finalmente citaremos tres familias de pájaros muy populares entre la gente cuales son la Fringillidae, que aporta especies como el pardillo común, jilguero, verdicillo, verderón, pinzón (los antes llamados pájaros de jaula y que hoy en día está muy per-

seguido su tráfico y captura), Emberizidae, es decir los escribanos montesino, soteño, cerillo y la familia Ploceidae que comprende los famosísimos gorriónes con las tres especies de gorrión común, chillón y molinero.

Una vez descritas, en su respectivas familias o agrupaciones designadas, las diferentes especies de aves en la zona de estudio, objeto de este artículo, enumeraremos todas ellas en el siguiente cuadro, donde especificaremos si son reproductores en la zona o no.

AVES DE LA ZONA DE OJOS NEGROS Y ALREDEDORES

Nombre	Nombre científico	Presencia	Reproducción
Anade azulón	Anas platyrhynchos	Escaso	SI
Cerceta común	Anas crecca	Escaso	NO
Zampullín común	Tachybaptus ruficollis	De paso	NO
Andarrios chico	Actitis hypoleucos	Escaso	¿?
Agachadiza común	Gallinago gallinago	Esporádico	NO
Avefría	Vanellus vanellus	De paso	NO
Chorlitejo chico	Charadrius dubius	De paso	NO
Chorlito carambolo	Charadrius morinellus	De paso	NO
Chorlito dorado	Pluvialis apricaria	De paso	NO
Polla de agua	Gallinula chloropus	Escaso	Crió, ahora NO
Rascon	Rallus aquaticus	Escaso	Crió, ahora NO
Gaviota reidora	Larus ridibundus	De paso	NO
Cigüeña blanca	Ciconia ciconia	De paso	NO
Grulla común	Grus grus	Invernante	NO
Buitre leonado	Gyps fulvus	Permanente	NO
Alimoche	Neophron percnopterus	De paso	NO
Aguila real	Aquila chrysaetos	Permanente	SI
Busardo ratonero	Buteo buteo	Escaso	¿?
Culebrera europea	Circaetus gallicus	Escaso	SI ¿?
Aguililla calzada	Hieraetus pennatus	Escaso	SI ¿?
Milano negro	Milvus migrans	De paso	NO
Milano real	Milvus milvus	De paso	NO
Azor	Accipiter gentilis	Escaso	SI ¿?
Aguilucho cenizo	Circus pygargus	Habitual	SI
Aguilucho pálido	Circus cyaneus	Invernante	NO
Gavilán	Accipiter nisus	Escaso	¿?
Halcón peregrino	Falco peregrinus	Habitual	SI
Cernícalo vulgar	Falco tinnunculus	Común	SI
Alcotán	Falco subbuteo	Común	SI
Esmerejón	Falco columbarius	Invernante	NO
Buho real	Bubo bubo	Escaso	SI
Buho chico	Asio otus	Escaso	SI
Mochuelo común	Athene noctua	Común	SI

Autillo	Otus scops	Habitual	SI
Lechuza común	Tyto alba	Escaso	SI
Lechuza campestre	Asio flammeus	Invernante	NO
Águila pescadora	Pandión haliaetus	Esporádi./Paso	NO
Elanio azul	Elanus caeruleus	Esporádi./Paso	NO
Perdiz roja	Alectoris rufa	Común	SI
Codorniz	Coturnix coturnix	Común	SI
Vencejo común	Apus apus	Habitual	SI
Avión común	Delichón úrbica	Escaso	SI ¿?
Avión roquero	Ptyonoprogne rupestris	Común	SI
Vencejo real	Apus melba	De paso	NO
Cuervo	Corvus corax	Común	SI
Corneja	Corvus corone	Común	SI
Grajilla	Corvus monédula	Habitual	SI
Arrendajo	Garrulus glandarius	Habitual	SI
Urraca	Pica pica	Común	SI
Chova piquirroja	Pyrhhorax pyrrhcorax	Común	SI
Estornino negro	Sturnus unicolor	Común	SI
Estornino pinto	Sturnus vulgaris	Invernante	NO
Paloma torcaz	Columba palumbus	Común	SI
Paloma bravía	Columba livia	Escaso	SI ¿?
Tórtola común	Streptotelia turtur	Común	SI
Avutarda	Otis tarda	Esporádico	NO
Sisón	Tetrax tetrax	Esporádico	SI ¿?
Ortega	Pterocles orientalis	Común	SI
Alcaraván	Burhinus oedicnemus	Escaso	SI
Alonda común	Alauda arvensis	Común	SI
Alondra de Dupont	Chersophilus duponti	Escaso	SI
Cogujada común	Galérída cristata	Común	SI
Cogujada montesina	Galérída theklae	Común	SI
Calandria	Melanocorypha calandra	Común	SI
Terrera común	Calandrella brachydactyla	Común	SI
Terrera marismeña	Calandrella rufescens	Común	SI
Carraca	Coracias garrulus	Esporádi./Paso	NO
Abejaruco	Merops apiaster	Escaso	NO
Abubilla	Upupa epops	Común	SI
Chotacabras gris	Caprimulgus europaeus	Escaso	SI ¿?
Chotacabras pardo	Caprimulgus ruficollis	Escaso	SI
Pito real	Picus viridis	Habitual	SI
Pico picapinos	Dendrocopos major	Escaso	NO
Oropéndola	Oriolus oriolus	Habitual	SI
Cuco	Cuculus canorus	Habitual	SI
Críalo	Clamator glandarius	Habitual	SI
Reyezuelo sencillo	Regulus regulus	Escaso	NO
Reyezuelo listado	Regulus ignicapillus	Escaso	NO
Carbonero común	Parus major	Habitual	SI

Carbonero garrapinos	<i>Parus ater</i>	Escaso	¿?
Herrerillo común	<i>Parus caeruleus</i>	Habitual	SI
Mito	<i>Aegithalos caudatus</i>	Escaso	SI
Trepador azul	<i>Sitta europea</i>	Escaso	NO
Mirlo común	<i>Turdus mérula</i>	Común	SI
Zorzal charlo	<i>Turdus viscivorus</i>	Invernante	NO
Zorzal común	<i>Turdus philomelos</i>	Invernante	NO
Collalba gris	<i>Oenanthe oenanthe</i>	Común	SI
Collalba rubia	<i>Oenanthe hispánica</i>	Común	SI
Collalba negra	<i>Oenanthe leucura</i>	Esporádico	SI ¿?
Tarabilla común	<i>Saxicola torquata</i>	Común	SI
Tarabilla norteña	<i>Saxicola rubetra</i>	De paso	NO
Chochín	<i>Troglodytes troglodytes</i>	Común	SI
Petirrojo	<i>Erithacus rubécula</i>	Común	SI
Pechiazul	<i>Luscinia svecica</i>	Esporádi./Paso	NO
Roquero rojo	<i>Monticola saxatilis</i>	Escaso	SI ¿?
Roquero solitario	<i>Monticola solitarius</i>	Esporádico	NO
Curruca capirotada	<i>Sylvia atricapilla</i>	De paso	NO
Curruca zarcera	<i>Sylvia communis</i>	Común	SI
Curruca rabilarga	<i>Sylvia undata</i>	Común	SI
Curruca carrasqueña	<i>Sylvia cantillans</i>	Común	SI
Curruca tomillera	<i>Sylvia conspicillata</i>	Común	SI
Curruca mosquitera	<i>Sylvia borin</i>	Común	SI
Zarcero común	<i>Hippolais polyglotta</i>	Común	SI
Mosquitero común	<i>Phylloscopus collybita</i>	De paso	NO
Mosquitero musical	<i>Phylloscopus trochilus</i>	De paso	NO
Mosquitero papialbo	<i>Phylloscopus bonelli</i>	Común	SI
Buitrón	<i>Cisticola juncidis</i>	De paso	NO
Colirrojo tizón	<i>Phoenicurus ochruros</i>	Común	SI
Colirrojo real	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	De paso	NO
Totovía	<i>Lullula arborea</i>	Habitual	SI
Bisbita alpino	<i>Anthus spinoletta</i>	Común	SI
Bisbita campestre	<i>Anthus campestris</i>	Común	SI
Lavandera blanca	<i>Motacilla alba</i>	Común	SI
Lavandera boyera	<i>Motacilla flava</i>	Común	SI ¿?
Papamoscas gris	<i>Muscicapa striata</i>	De paso	NO
Papamoscas cerrojillo	<i>Ficedula hypoleuca</i>	De paso	NO
Alcaudón real	<i>Lanius excubitor</i>	Común	SI
Alcaudón común	<i>Lanius senator</i>	Común	SI
Alcaudón dorsirrojo	<i>Lanius collurio</i>	Esporádico	¿?
Pardillo común	<i>Carduelis cannabina</i>	Común	SI
Jilguero	<i>Carduelis carduelis</i>	Común	SI
Verdecillo	<i>Serinus serinus</i>	Común	SI
Verderón común	<i>Carduelis chloris</i>	Común	SI
Verderón serrano	<i>Serinus citrinella</i>	Esporádico	NO
Pinzón común	<i>Fringilla coelebs</i>	Común	SI

Gorrión común	Passer domesticus	Común	SI
Gorrión chillón	Petronia petronia	Común	SI
Gorrión molinero	Passer montanus	Común	SI
Escribano hortelano	Emberiza hortulana	Común	SI
Escribano montesino	Emberiza cia	Común	SI
Escribano soteño	Emberiza cirrus	Común	SI
Escribano cerillo	Emberiza citrinella	Común	SI
Triguero	Miliaria calandra	Común	SI

BIBLIOGRAFÍA

VARIOS AUTORES (1994): "Naturaleza de Aragón: su fauna y su flora" *El Periódico de Aragón*.

PETERSON, MONFORT y HOLLON (1980): *Guía de campo de las aves de España y Europa*. Edit. Omega.

BERTEL BRUUN, ARTHUR SINGER (1971): *Guía de las aves de Europa*. Ediciones Omega.

DE JUANA, EDUARDO (1995): *Lista de aves de la Península Ibérica*, S.E.O.

REVISTA XILOCA, nº 12, (1993), nº 14 (1994).

Quiero manifestar mi agradecimiento a Julio Sánchez (guarda del COMENA de Monreal) y sobre todo a Javier Ruiz de Ojos Neros, experto naturalista, con el que he compartido casi todos los datos.