

XILOCA 14
págs. 147-156
1994
ISSN: 0214-1175

ORNITOFAUNA DE OJOS NEGROS: AVES ESTEPARIAS

José M.^a Cereza Abadías*

Resumen.- Descripción ornitofaunística de las aves esteparias en el medio natural de Ojos Negros, distinguiendo cuatro diferentes biotopos: el medio estepario, el Mediterráneo, rupícola y la zona húmeda.

Estudio del grupo de aves esteparias, de las 105 especies que existen en la zona, con sus características, sus lugares de localización, procedencias y otras curiosidades directamente ligadas a las actividades agrícolas y ganaderas de este pueblo.

Abstract.- This is a description of the ornithofauna of the steppe birds in Ojos Negros environment, distinguishing four different environments: steppe, Mediterranean, rupicola and wet area.

An enumeration of the steppe bird group, from the 105 species existing in the area, is offered, including its characteristics, finding places, origin and other curiosities of these birds directly linked to the agricultural and cattle activities of this town.

Ojos Negros, localidad enclavada en las faldas de Sierra Menera, a una altura de 1151 m/snm, constituye uno de esos pueblos de la cuenca alta del río Jiloca donde su, a primera vista, evidente sequedad, se va a transformar en términos de ornitología en un vergel que hará disfrutar a cualquier experto o aficionado a la naturaleza, que por este pueblo se acerque. Mi encuentro con Ojos Negros, se produjo ya hace 14 años y desde entonces no he dejado de recorrer todos los recovecos del término

* Veterinario y naturalista.

Quiero manifestar mi agradecimiento a Julio Sánchez (Guarda del COMENA de Monreal) con el que contrasté mis observaciones.

La descripción de las aves en este artículo está referida al término de Ojos Negros si bien podría hacerse extensiva esta avifauna a otras muchas localidades de la Cuenca del Jiloca.

municipal, extenso por otra parte, y he ido identificando especies animales (aves, mamíferos, reptiles, anfibios, insectos) siendo lo más abundante de las especies mayores las aves. Alrededor de 105 especies diferentes de aves he podido reconocer hasta ahora en Ojos Negros, cifra que causa sorpresa y posterior admiración a propios y extraños. De ese extenso término municipal al que hacía referencia anteriormente, en relación a los medios naturales o diferentes biotopos que en él podemos distinguir, en mi particular apreciación serían cuatro: Biotopo estepario, biotopo de bosque mediterráneo, medio rupícola y zonas húmedas (balsas).

– *Medio Estepario*: Me refiero a la típica estepa cerealista, parameras... muy bien representadas en Ojos Negros con zonas como "La Dehesa", "El Campo", "Mierla", "Llano Gabasa", "Las Cañadas", "Las Pairedillas", "Solacuerda" etc. Amplísimos campos de cereal se abren a nuestros ojos, con tablas yermas y relieves alfombrados por aliagas, estepas y un ramillete de plantas aromáticas (espliego, tomillo, romero) que van a dar olor a las primaveras en el monte de Ojos Negros.

– *Biotopo Mediterráneo*: Denominaremos así al bosque de encinas, llamadas aquí "chaparros" que van a ser los árboles más abundantes y representativos en este pueblo. Desafortunadamente no podemos contar con carrascales muy maduros, pues rotatoriamente son talados por los habitantes del pueblo cuando según los sorteos anuales se adjudican las "suertes" de leña. Destacaremos zonas con este biotopo en "El Tajadal", "Carramonreal", "Peña Rubia", "Traslabalsa". En las faldas de Sierra Menera, la carrasca se entremezcla con robles, siendo el bosque más variado. A resaltar la presencia, en todo el término municipal, de una única sabina (de porte arbóreo) en la zona de las Cañadas.

– *Medio rupícola*: nos referiremos a los cortados, peñas, pedregales, ramblas como "Peña Rubia", "Los Castillejos", "Peña El Tormo", "Rambla de las Salinas" y englobaríamos aquí a los taludes de las minas hoy abandonadas.

– *Zonas húmedas*: Daremos esta curiosa denominación a las numerosas balsas que se reparten por todo el término y que van a ser claves en la observación y biología de muchas aves. Citaremos entre otras: "El Anillo", "El Terzón", "Los Ramblares", "Solacuerda", "La Pajaranca", etc. Así mismo contaremos con la presencia de alguna chopera en lugares con más querencia a la humedad, como en el "Ojo de Mierla" o en la "Rambla de las Salinas".

Dada esta visión de lo que es Ojos Negros en relación a sus medios naturales, nos adentraremos ya en la descripción de un grupo de aves, de esas 106 especies a las que me he referido, que va a ser uno de los más representativos de la zona, cual es el de *aves esteparias* y entre las que citaremos, la avutarda, ortega, sisón, alcaraván, cogujada común y montesina, alondra de Dupont y común, calandria, terrera común, collalba rubia y gris, como propiamente esteparias, y otras especies muy relacionadas a este biotopo, como son el estornino negro, cuervo, corneja, chova piquirroja, triguero y gorrión chillón entre otras.


AVUTARDA (*Otis tarda*): La citaremos en primer lugar por ser la reina indiscutible de la estepa hispana, pero la citaremos con añoranza pues nos tendremos que remitir a tiempos pasados para ver estas tierras turolenses pobladas de nutridos grupos de avutardas. En Ojos Negros aún mucha gente recuerda a estas aves que juntas "pare-

cían rebaños de ovejas", cuentan. En la actualidad, su paso por Ojos Negros es muy ocasional y en período post-nupcial (tras la cría), proviniendo de grupos estables que se localizan en los alrededores de la Laguna de Gallocanta, y en la cercana provincia de Guadalajara por el pueblo de Tordesilos. La cría de la avutarda en la cuenca alta del Jiloca, es pues muy excepcional. Su puesta es de 2-3 huevos en el suelo, destacando los machos por sus largos "bigotes" (se les llama barbones), siendo además de las aves más pesadas de la fauna española, su peso puede llegar a 15-17 kgr.

SISON (*Tetrax tetrax*): El sisón va a ser el hermano pequeño de la avutarda. En estas tierras es conocido y no lejos de Ojos Negros hasta da nombre a un pueblo: Torralba de los Sisones. Los machos ostentan, sobre todo en la época de reproducción, un cuello blanco y negro muy evidente y en vuelo destacan por su predominante color blanco que contrasta con los tonos ocre y marrones de la estepa cerealista. En Ojos Negros no abunda siendo su presencia esporádica. Sus puestas pueden llegar a 5 huevos y tras 21 días de incubación, salen los pollos que son nidífugos.

ORTEGA (*Pterocles orientalis*): Bajo mi punto de vista, si un ave pudiera representar la avifauna de este pueblo, no tendría dudas acerca de la elección: la ortega.

Las "turras", que es como son conocidas aquí, de siempre se han ligado a las actividades de la gente en el campo. Los pastores las conocen pues dicen acudían a la sal que echaban al ganado... y quien no se verá sorprendido, paseando por las llanuras de estos términos, por el vuelo rápido de estas aves con sus sonoros "churr-churr". De plumaje con tonos ocre y marrones, les hace gozar de gran mimetismo



Ortega

en el entorno donde viven. En la biología de la ortega, destacaremos sus desplazamientos en la época seca o balsas donde acuden con suma puntualidad, a la misma hora cada día, a beber y recoger agua en las plumas de su pecho, para ser transportada a los pollos. Realizan 1-2 puestas al año, pudiendo ser la segunda muy avanzado el verano, como así pude comprobar personalmente el pasado 15 de agosto, en el que una ortega estaba incubando tres huevos. Las zonas de "Los Ramblares" y "Solacuerda", son buenas para su observación en Ojos Negros.


ALCARAVAN (*Burhinus oedicnemus*): El "chorlito", que es el nombre con el que se le conoce, se puede detectar en determinadas zonas, donde al lado de los campos de cultivo se encuentren pedregales. Antes más abundantes, hoy en día es más escaso, siendo inconfundible su trote por los labrados y por los yermos, subiendo y bajando la cabeza, destacando al levantar el vuelo, su inconfundible franja alar blanca. Su canto al atardecer es muy característico. Pone habitualmente 2 huevos en una mínima depresión del suelo y los pollos como los de las especies descritas hasta ahora, abandonan el nido nada más nacer. Los "llanos de Gabasa", de siempre en Ojos Negros, ha sido una buena zona "chorlitera".

CALANDRIA (*Melanocorypha calandra*): Esta ave, pasa por ser la de mayor tamaño de la familia de los alaúridos, distinguiéndose además, por el medio collar negro a cada lado del cuello que la hacen inconfundible. Propias de terrenos yermos, de cultivo y estepas, las calandrias poseen un sonoro trino con el que se elevan y tras él se lanzan en silencio hasta el suelo en una rápida caída. En Ojos Negros abunda en las zonas de "Solacuerda", "El Campo", "Mierla"... y se la conoce, si bien no sabría decir si es a esta o a la alondra, como despistapastor. Suele realizar dos polladas y ya construye nido con material, permaneciendo los pollos en el nido (nidícolas).

COGUJADA MONTESINA (*Galerida theklae*): La popular "moñuda" está omnipresente en todo el término de Ojos Negros. Su larga cresta empinada la diferencian de los otros alaúridos si bien para distinguirla correctamente de la *Cogujada común* (*Galérda cristata*), hay que tenerlas muy cerca para apreciar las diferencias. Quizás la montesina ocupa una distribución a mayor altura que la común. La imagen de las "moñudas", cantando en el mojón del camino o en el "torroco", es muy familiar para todo el mundo, encontrándose en eras muy cercanas al pueblo. Construye el nido en una depresión del suelo y sus puestas son de 3-6 huevos, permaneciendo los pollos en el nido tras la eclosión, unos 15 días.

ALONDRA (*Alauda arvensis*): Este alaúrido de similar tamaño a las cogujadas, se diferencia de ellas por tener una cresta más pequeña, redonda y menos pronunciada y poseer los bordes de la cola blancos. En muchos lugares de Aragón se le conoce como "aloda" y tiene una característica en su comportamiento, cual es su sonoro y claro canto largamente sostenido en vuelo. Menos serrana que la cogujada montesina, en invierno forma bandos a veces muy numerosos cuyos trinos al volar cortan el frío de las heladas mañanas en el campo de Ojos Negros. La "Dehesa" y "El Campo", son lugares apropiados para su observación.

TERRERA COMÚN (*Calandrella cinerea*): La terrera común va a ser más pequeña que alondras y cogujadas, careciendo de la cresta que éstas poseen. Se distinguen por unas manchas negruzcas a ambos lados del cuello, a veces difíciles de apreciar. Es buena cantadora, como el resto de alaúridos, emitiendo abundantes gorjeos en




La Cañada de Gabasa entre manchas de carrascales ha sido tradicionalmente una buen zona para la observación de alcaraván.



La zona de Las Cañadas, con las Muelas al fondo, encarnan el medio cerealista estepario muy abundante en Ojos Negros.



Una balsa en medio de campos y parameras, que repartidas por el término de Ojos Negros, van a jugar un papel fundamental como puntos húmedos en la estación seca.



Una pareja de Ortigas (*Pterocles orientalis*) se acercan a beber a una balsa.



Cogujada montesina (*Galérda teklae*), la popular "moñuda" es de las aves esteparias más abundantes.



La collalba rubia (*Oenanthe hispánica*) domina su territorio desde lo alto de una aliaga.

los vuelos ascendentes y descendentes. Suele sacar dos polladas al año y a veces cría en colonias. Gusta de terrenos abiertos y será fácil detectarla en las zonas adeshadas de Ojos Negros.

ALONDRA DE DUPONT (*Chersophilus duponti*): Este alaúdido va a ser el más raro de la familia. Hace unos años se le daba por extinguida en Aragón, pudiéndose hoy ver y oír en varias zonas de la Comunidad como Belchite y Osera en Zaragoza, Ballobar en Huesca, Campo Visiedo en Teruel. En Ojos Negros no se ha identificado todavía, si bien no sería de extrañar su presencia pues unas cuantas parejas son estables en el cercano pueblo de Blancas. Serán necesarios más campeos por las zonas próximas a Monreal, Pozuel... para confirmar su afiliación "ojonegrina".

COLLALBA RUBIA (*Oenanthe hispánica*): La collada rubia es la más estepárica de los miembros de esta familia, que cuenta en Ojos Negros con la presencia de otros dos parientes, la *collalba gris* (*oenanthe oenanthe*) y la *collalba negra* (*oenanthe leucura*). Sus ocreos colores con el antifaz negro que posee el macho la hacen de fácil identificación en el campo. Su nombre vernacular en Ojos Negros es de lo más pintoresco: "zorribalba marina"... ahí es nada. Son pájaros inquietos que dan cortos vuelos parándose en resaltes o matas en las que dominan su territorio. La podemos ver en "La Pajaranca", "Rambla de las Salinas" o en los alrededores del "Santo Cristo".

Entre otras aves no propiamente esteparias pero que conviven con las descritas anteriormente en los mismos medios, citaremos:

COLLALBA GRIS (*Oenanthe oenanthe*): La conocida "zorribalba", está presente en todo el término de Ojos Negros, viéndola hasta en eras del interior del pueblo. Muy abundante, es reconocida por todos por su tonos grises y negro antifaz del macho y colores más apagados de la hembra, destacando en ambos la característica cola blanca con negra T, evidente al levantar el vuelo. Cria en las paredes de parideras, en los montones de piedras y convive con las aves esteparias en las llanuras y parameras.

ESTORNINO NEGRO (*Sturnus unicolor*): El ubicuitario estornino está presente en todos los biotopos humanizados no sólo de Ojos Negros sino de cualquier otra localidad. Cria en las masadas abandonadas y en los tejados de las casas del pueblo y acude a la estepa en nutridos bandos, siendo habitual cliente de las balsas del término, sobre todo en verano. La llegada de un grupo de estorninos a estos puntos húmedos, constituye todo un espectáculo.

CHOVA PIQUIRROJA (*Pyrhocorax pyrrhocorax*): Este córvido "gralla de pico rojo", es absolutamente inconfundible: negro en su totalidad menos patas y pico rojo. Cria en los cortados rocosos y masadas en ruinas y sus "quejidos" emitidos al volar, recuerdan ambientes más serranos que los esteparios que nos ocupan. Junto a la chova, otros dos córvidos pueden ser vistos por los llanos cerealistas y secas lomas, estos son el CUERVO (*corvus corax*) y la CORNEJA (*corvus corone*).

TRIGUERO (*Emberiza calandra*): Es de la familia de los escribanos, conocido por todos por su reclamo, típico chirrido, emitido desde una mata o en lo alto de un chaparro.

GORRIÓN CHILLÓN (*Petronia petronia*): De las 4 especies de gorriónes que en Aragón podemos ver (común, molinero, chillón y nival), aparte del urbano gorrión

común (paser domesticus) el chillón es de los más abundantes en el campo. Las balsas que en verano cobran importancia en la dehesa se ven concurridas por bandos de gorrones chillones, cuya mancha amarilla en la garganta les identifica plenamente.

Terminamos con esto la descripción de las aves esteparias en Ojos Negros, grupo de especies muy emblemáticas en el pueblo y de siempre ligadas o cerca de las actividades agrícolas y ganaderas de las gentes de este pueblo.

Cuadro 1. Aves esteparias

Nombre	Nombre Científico	Nombre en Ojos Negros	Otros nombres en Aragón	Presencia en Ojos Negros
Avutarda	Otis tarda	Avutarda	Auca	De paso ocasional
Sisón	Tetrax tetrax	Sisón	Sisote	Raro Nidificante?
Ortega	Pterocles orientalis	Turra	Churra	Nidificante
Alcaraván	Burhinus oedicephalus	Chorlito	Terlid	Nidificante
Calandria	Melanocorypha calandra	Burlapastor?	Corbatón	Nidificante
Cogujada montesina	Galérda teklae	Moñuda	Cucullada Golloria monte	Nidificante
Cogujada común	Galérda cristata	Moñuda	Cucullada Golloria moñuda	Nidificante
Alondra común	Alauda arvensis	Burlapastor?	Aloda	Nidificante
Alondra de Dupont	Chersophilus duponti	¿ ?	Rocín	¿¿¿ ????
Terrera común	Calandrella cinerea	¿ ?	Recachadera	Nidificante
Collalba rubia	Oenanthe hispanica	Zorribalba marina	Culiblanca	Nidificante
Collalba gris	Denanthe oenanthe	Zorribalba	Culiblanca	Nidificante

BIBLIOGRAFÍA

- A. ARAGÜES, J. LUCIENTES**, Fauna de Aragón: Las aves. Guara editorial. 1980.
- VARIOS AUTORES**. Naturaleza de Aragón: su fauna y su flora. El Periródico de Aragón. 1994.
- VARIOS AUTORES**. Donde ver aves en España Peninsular. SEO. Edit. Lyn 1994.
- COLIN HARRISON**. Nidos, huevos y polluelos de las aves de España y Europa. Edit. Omega. 1977.
- PETERSON, MONTFORT y HOLLON**. Guía de campo de las aves de España y Europa. Edit. Omega. 1980.
- Revista Xiloca n.º 12**. 1993.