

XILOCA 9
págs. 201-215
1992

SOBRE LA FLORA DE LA COMARCA DEL JILOCA, VI

Gonzalo Mateo Sanz*

Resumen.- Se presenta la sexta entrega del catálogo comentado de la flora vascular de la comarca del Jiloca, concretado, en este caso, a las familias comprendidas entre las Convolvuláceas y las Crucíferas, siguiendo los criterios comentados en anteriores entregas.

Summary.- It is presented the sixth part of the commented catalogue of the vascular flora of the region of the Jiloca. This time are specified the families from the convolvulaceae to the cruciferae, following the standards commented in preceding parts.

FAM. CONVULVULACEAE (Convolvuláceas)

1. CALYSTEGIA sepium (L.) R. Br. (Corregüela mayor)

Hierba trepadora, de hojas sagitadas y flores blancas vistosas en forma de embudo, que habita en juncuales y cañaverales instalados en márgenes de ríos y acequias.

2. CONVULVULUS arvensis L. (corregüela menor, campanillas)

Una de las hierbas más comunes de la comarca, extendida por campos de cultivo y todo tipo de herbazales transitados, escasamente trepadora y diferenciada de la anterior por su menor tamaño, hojas en escudo y flores menores, algo rosadas.

3. CONVULVULUS lineatus L. (Campanilla espigada)

Hierba tendida o apenas ascendente, con hojas estrechas y alargadas, y flores muy similares a la anterior aunque algo más aglomeradas. Resulta frecuente en márgenes de caminos y terrenos baldíos secos.

* Departamento de Biología Vegetal. Universidad de Valencia.



1. Las campanillas comunes (*Convolvulus arvensis*), con sus características hojas en escudo y flores en embudo, discretas pero vistosas.



2. La cúscuta común (*Cuscuta epithymum*) envolviendo con sus ramas filamentosas y sus glomérulos florales una mata de tomillo al que parasitan.

4-6. **CUSCUTA epithymum** (L.) L. (Cúscuta)

Junto con otros congéneres como **C. approximata** Babington y **C. planiflora** Ten., hierbas parásitas formadas por una maraña de filamentos sin hojas, de color amarillento o rojizo, que forman pequeños glomérulos de flores. Suelen verse en pastizales vivaces y matorrales soleados fuertemente enganchadas a leguminosas, rubiáceas, labiadas, etc.

FAM. CORNACEAE (Cornáceas)

1. **CORNUS sanguinea** L. (Cornejo, sanguino)

Arbusto de mediana elevación, con hojas redondeadas blandas y caducas, que se presenta relativamente extendido por los setos y bosques ribereños de la comarca.

FAM. CRASSULACEAE (Crassuláceas)

1. **PISTORINIA hispanica** (L.) DC.

Hierba anual erguida de raíces muy tenues, con hojas pequeñas y carnosas, que termina en un corimbo de flores rojizas. Resulta característica de los pastizales secos sobre suelos arenosos silíceos de las zonas interiores de la meseta ibérica, llegando a alcanzar a presentarse en el cuadrante noroeste de la comarca.

2. **SEDUM acre** L. (Pan de cuco)

Planta perenne pero poco elevada, con hojas densamente imbricadas y flores amarillas. Aparece ampliamente extendido por toda la comarca, habitando en roquedos calizos, matorrales secos sobre suelos muy esqueléticos, e incluso por los muros y tejados de las viviendas.

3. **SEDUM album** L. (Siempreviva menor)

Bien diferenciado de los otros por sus hojas alargadas y espaciadas, en forma de maza, y sus flores blancas. Resulta bastante frecuente en medios rocosos y matorrales muy degradados.

4. **SEDUM amplexicaule** DC.


Hierba perenne pero muy poco robusta, aparentando ser casi anual. Tiene hojas muy estrechas, casi filiformes en la madurez, y las flores amarillas. Habita en pastizales vivaces secos y bien iluminados sobre suelos silíceos, estando bastante extendida en la zona.

5. **SEDUM brevifolium** DC.

Hierba perenne caracterizada por sus hojas pequeñas, lustrosas y casi esféricas, de color rojizo, así como sus pequeñas flores blancas o algo rojizas. Se presenta en rocas silíceas o matorrales muy degradados sobre terrenos erosionados.

6. **SEDUM dasyphyllum** L.

Parecido al anterior, del que difiere por su color verde claro, sus flores siempre blancas y la pubescencia con que suele cubrirse. Resulta habitual por los roquedos



3. El frecuente pan de cuco (*Sedum acre*), de cortos tallos cubiertos de densas hojas carnosas, colonizando los escasos acúmulos de tierra entre las piedras de un muro agrícola.



4. *Sedum brevifolium*, pequeña hierba de hojas carnosas esféricas, colonizando una losa de rodeno cerca del castillo de Peracense.

y pedregales de naturaleza básica de toda la zona, interviniendo en ocasiones en tejados y muros de los edificios.

7. **SEDUM forsteranum** Sm.

Provisto de curiosas rosetas estériles de hojas en forma semiesférica y flores amarillas. Es planta de apetencias atlánticas que alcanza las zonas de rebollares silicícolas del norte y oeste de la comarca, buscando ambientes no tan secos ni soleados como los de otros congéneres.

8. **SEDUM sediforme** (Jacq.) Pau (Uña de gato, uva de pastor)

Una de las especies más robustas y difundidas del género por toda España. Sus hojas son fusiformes y muy carnosas, y sus flores son amarillentas, apareciendo en el período de máximo calor estival. Puede observarse abundantemente en las grietas de los roquedos, en los pedregales soleados, en matorrales y pastizales secos, márgenes de caminos, bosques aclarados, e incluso los techos y muros de muchas viviendas.

9. **SEMPERVIVUM tectorum** L. (Siempre viva mayor)

Hierba provista de robustas rosetas de hojas carnosas pero aplanadas, algunas de las cuales emiten en agosto escapos de flores rojizas con numerosos pétalos. Se cultiva como ornamental y medicinal, observándose naturalizado en muros y tejados por los pueblos y casas de campo.



5. La uña de gato (*Sedum sediforme*), la planta más frecuente y robusta de su género, mostrando sus inflorescencias apiramidadas que acompañan los días de mayor calor del año.

10. **UMBILICUS rupestris** (Salisb.) Dandy (Ombligo de Venus, oreja de fraile)

Fácilmente reconocible por sus hojas crasas pero en forma de sombrilla y sus flores poco vistosas, con pétalos blanquecinos o verdosos soldados en tubo. Puede verse en ambientes de roquedo y en muros de construcciones humanas.

FAM. CRUCIFERAE (Crucíferas)

1. **AETHIONEMA saxatile** (L.) R.Br.

Hierba perenne, a veces algo leñosa en la base, con hojas elípticas algo rojizas. Sus flores son rosadas y dan frutos rodeados de un ala amplia. Interviene en la zona en la colonización de algunos roquedos calizos no muy soleados.

2. **ALLIARIA petiolata** (Andrz ex Bieb.) Cavara & Grande (Aliaria, hierba ajera)

Hierba perenne, de hojas anchas y tenues, que se presenta en los bosques caducifolios transitados, especialmente ribereños, y herbazales sombreados de su entorno.

3-6. **ALYSSUM alyssoides** (L.) L. (Hierba de la rabia)

Hierba anual, de flores amarillas muy pequeñas, con frutos disciformes de unos milímetros. Se presenta abundante en pastizales secos anuales, más o menos nitrófilos, por caminos, terrenos baldíos y claros muy degradados de los matorrales. Con aspecto similar y en los mismos ambientes pueden verse otros tres congéneres pró-



6. *Alyssum lapeyrouisianum*, pequeño arbusto de color plateado, con sus frutos en forma de cuchara ya maduros al final de la primavera.

ximos: **A. granatense** Boiss. & Reuter, **A. linifolium** Steph. ex Willd. y **A. simplex** Rudolphi.

7. **ALYSSUM lapeyrousianum** Jordan

Pequeña mata leñosa pero no espinosa, con flores blancas, que se presenta extendida por los matorrales secos sobre terrenos de naturaleza básica.

8. **ALYSSUM montanum** L.

Hierba perenne, a veces algo leñosa en la base, rastrera o algo ascendente, y con flores amarillas. Aparece en pastizales y matorrales achaparrados por las partes más elevadas y menos secas de la comarca.

9. **ALYSSUM serpyllifolium** Desf.

Bastante parecido al anterior en sus hojas y flores, pero con porte más claramente arbustivo y erguido, habitando en matorrales secos y no muy elevados.

10. **ALYSSUM spinosum** L. (Pendejo, aliagueta)

Arbusto muy rígido, leñoso y espinoso, con porte almohadillado, hojas pequeñas y flores blancas. Se presenta extendido por las áreas con afloramiento de sustratos básicos, habitando en roquedos y pedregales secos.

11. **ARABIDOPSIS thaliana** (L.) Heynh.

Hierba anual muy tenue, con pocas y pequeñas hojas, flores blancas y frutos muy finos y alargados. Resulta común en la comarca por los pastizales efímeros de primavera instalados sobre suelos arenosos silíceos.

12-13. **ARABIS auriculata** Lam.

Hierba anual muy ramosa, con pequeñas flores blancas y frutos lineares de 1 mm de anchura. Coloniza pedregales y claros secos de bosques y matorrales, donde se hace presente de modo temprano desde el comienzo de la primavera. Muy similar a ella, pero mucho más rara, puede encontrarse **A. nova** Vill., por las áreas más húmedas de montaña.

14-16. **ARABIS hirsuta** (L.) Scop.

Se trata de una hierba perenne, bastante más robusta que la anterior, y adaptada a ambientes más húmedos relacionados con las zonas de vega y orlas de bosque caducifolio, caracterizada por sus largos racimos de flores que dan frutos muy erguidos y aplicados sobre el tallo. Con aspecto y hábitat similar está también la **A. planisiliqua** (Pers.) Reichenb., algo más elevada y menos pelosa, así como la **A. scabra** All., menos elevada, más ramosa y con frutos en corto número.

17. **BARBAREA vulgaris** R. Br. (Hierba de Santa Bárbara)

Hierba jugosa, de hojas divididas en segmentos redondeados y flores amarillas, que aparece en prados húmedos y en las zonas de vega, formando parte de herbazales siempre húmedos aunque algo nitrófilos.

18-20. **BISCUTELLA atropurpurea** G. Mateo & Figuerola

Hierba perenne, provista de una roseta de hojas estrechas, hirsutas y dentadas, con flores amarillas que producen frutos divididos en dos mitades lenticulares iguales.

Habita en matorrales y pastizales secos sobre sustratos silíceos, siendo sustituida en las zonas calizas frescas por **B. alcarriae** Segura y en las menos elevadas por **B. valentina** (L.) Heywood.

21. **BISCUTELLA auriculata** L. (Anteojeras)

Hierba anual, pero habitualmente más elevada y robusta que las anteriores, con flores y frutos bastante más grandes. Resulta frecuente como mala hierba de los campos de secano por casi toda la comarca.

22. **BRASSICA nigra** (L.) Koch (Mostaza negra)

Hierba anual, de mediana estatura, con flores amarillas y frutos cónicos, que aparece relativamente extendida por los campos de cultivo y herbazales nitrófilos.



7. Las anteojeras (género *Biscutella*) resultan inconfundibles por sus frutos formados por dos mitades lenticulares iguales.

23. **BRASSICA oleracea** L. (Coles, berzas)

Grupo complejo de especies y variedades ampliamente cultivadas en los huertos, pero que con frecuencia se encuentran igualmente más o menos naturalizadas en las zonas transitadas.

24. **BRASSICA repanda** (Willd.) DC.

Unico representante silvestre del género en la comarca, siendo plantas herbáceas rosuladas, con racimos de flores amarillas que dan frutos cilíndricos no muy gruesos. Puede verse por las partes menos elevadas y más secas de la misma, interviniendo en matorrales y pastizales secos sobre suelos margosos o calizos.

25. **CALEPINA irregularis** (Asso) Thell.

Hierba anual algo jugosa, con frutos subesféricos indehiscentes. Coloniza herbazales subnitrófilos que se instalan en áreas algo húmedas y sombreadas, correspondientes a orlas de bosques ribereños o algo húmedos.

26. **CAMELINA microcarpa** Andr. ex DC. (Camelina)

Hierba anual erguida que da racimos de flores blancas y frutos piriformes de unos 5-8 mm. resulta frecuente como mala hierba de los campos de secano y en los herbazales nitrófilos que se instalan en las zonas habitadas o frecuentadas.

27. **CAPSELLA bursa-pastoris** (L.) Medicus (Paniquesillo, zurrón de pastor, bolsa de pastor)

Hierba anual, caracterizada por sus frutos aplanados triangulares, ensanchados hacia el ápice. Resulta muy frecuente en campos de cultivo y herbazales nitrófilos ricos en residuos, estiércol, etc.

28. **CARDAMINE hirsuta** L. (Mastuerzo menor)

Hierba anual muy tenue, con flores blancas y frutos estrechamente cilíndricos que estallan al madurar al menor contacto. Vive en pastizales anuales, algo nitrófilos, pero siempre poco soleados; penetrando en linderos de bosque o ribazos de los campos de cultivo.

29. **CLYPEOLA johanthlaspi** L. (Cabeza de mosca)

Pequeña hierba anual, con flores amarillentas y frutos lenticulares, que aparece en pastizales efímeros primaverales sobre suelos pedregosos o arenosos secos.

30. **COCHLEARIA glastifolia** L.

Hierba robusta, de hojas glabras y sentadas, sagitadas en la base, con flores blancas y frutos subesféricos. Suele aparecer en juncuales y pastizales perennes sobre suelos húmedos. Unicamente ha sido detectada en la provincia de Teruel por ASSO, quien la recolectó hace más de 200 años en Calamocha y Monreal.

31. **CONRINGIA orientalis** (L.) Dumort. (Collejón, berza campestre)

Hierba anual, algo elevada, caracterizada por sus hojas muy glabras y algo carnosas, enteras y abrazadoras; así como sus flores blancas y frutos muy estrechos y alargados. Se presenta bastante extendida por la comarca vegetando en los campos cerealistas de secano.

32. **CORONOPUS squamatus** (Forsskal) Ascherson (Mastuerzo verrugoso)

Hierba anual rastrera pero robusta, con hojas muy recortadas y frutos cónicos cubiertos de tuberosidades. Habita en terrenos fangosos frecuentados por el hombre o sus rebaños, húmedos en primavera, pero que se secan en verano.

33. **DESCURAINIA sophia** (L.) Webb ex Prantl (Arnacho, hierba de Santa Sofía, ajenjo loco)

Hierba anual, de hojas finamente recortadas en numerosos segmentos, con flores amarillas y frutos estrechamente cilíndricos. De marcado carácter nitrófilo, habitando en las proximidades de poblaciones, basureros, corrales, etc.

34. **DIPLOTAXIS eruroides** (L.) DC. (Rabaniza blanca)

Hierba anual, igualmente nitrófila, con flores blancas o algo rosadas, que florece durante casi todo el año, destacando en otoño e invierno, cuando casi ninguna otra planta se mantiene en flor, tapizando el suelo de huertos, viñedos y casi todo tipo de campos de cultivo.

35. **DIPLOTAXIS viminea** (L.) DC., Reg. Veg. Syst. Nat. 2: 635

Más escasa que la anterior, así como menos vistosa, teniendo flores amarillas muy discretas y presentándose en ambientes similares.

36. **DRABA hispanica** Boiss.

Planta herbácea o algo leñosa en la base, que forma una densa roseta de pequeñas hojas lineares de la que surge un corto tallo que forma al comienzo de la primavera flores amarillas, que dan pronto frutos elípticos hirsutos. Resulta muy escasa en la comarca, donde habita en las grietas de roquedos calizos no muy soleados.

37. **DRABA verna** L., Sp. Pl. 642 (1753)

Pequeña hierba anual, que también forma rosetas de hojas basales y emite cortos escapos, en este caso muy tenues y con flores blancas. Muy extendida por herbazales anuales subnitrófilos de floración temprana, desde incluso finales del invierno, penetrando con frecuencia en los campos de secano.

38. **ERUCA vesicaria** (L.) Cav. (Eruca, ruca)

Hierba anual caracterizada por sus flores amarillentas con nervios muy marcados en los pétalos, dando frutos fusiformes algo carnosos o engrosados. Es planta nitrófila, que vemos aparecer en las partes menos frescas de la comarca cerca de las zonas frecuentadas por el hombre.

39. **ERUCASTRUM nasturtiifolium** (Poiret) O.E. Schulz

Hierba perenne, con hojas profundamente recortadas en lóbulos regulares, casi enteros, flores amarillas y frutos alargados y cuadrangulares. Característica de herbazales nitrófilos anuales, suele aparecer también en matorrales y pastizales secos vivaces, cuando están muy alterados o pastoreados, lo cual resulta bastante habitual.

40. **ERYSIMUM medio-hispanicum** Polatschek

Hierba perenne, con hojas lineares y flores amarillas de tamaño mediano. Especie endémica de las sierras castellanas y aragonesas, aún insuficientemente conocida, que habita en matorrales secos muy aclarados sobre sustratos calizos.



8. La rabaniza blanca (*Diplotaxis erucoides*), planta frecuente en los campos de cultivo, mostrando un aspecto muy característico de los miembros de la familia de las Crucíferas, con numerosos frutos alargados y estrechos.

41-42. **ERYSIMUM incanum** G. Kinze

Similar a la anterior, pero anual y de menor tamaño en todas sus partes, habitando en herbazales algo nitrófilos por claros soleados de bosques y matorrales sobre terrenos calizos. En ambientes más decididamente nitrófilos la sustituye **E. repandum** L.

43. **HESPERIS laciniata** All.

Hierba perenne muy viscosa, con flores de color lila y frutos largamente cilíndricos. Interviene en pedregales calizos situados al pie de roquedos calizos sombreados. Únicamente se ha encontrado en la provincia por la Sierra de Cucalón.

44. **HIRSCHFELDIA incana** (L.) Lagrèze-Fossat

Hierba poco atractiva, con flores que pasan desapercibidas y frutos estrechamente cónicos y aplicados al tallo, apenas visibles, que aparece extendida por los márgenes de caminos y campos de secano.

45. **HUTCHINSIA petraea** (L.) R. Br. (Mastuerzo de peñas)

Hierba anual muy tenue y de corta estatura, con hojas profundamente recortadas y flores blancas inaparentes, característica de los pequeños pastizales secos anuales de floración temprana.

46. **HYMENOLOBUS procumbens** (L.) Nutt

Parecida a la anterior, aunque más grácil y elevada, habitando en ambientes algo húmedos sobre suelos ricos en sales, donde florece al comienzo de la primavera, sobre todo por las proximidades de la laguna de Gallocanta.

47. **IBERIS amara** L. (Carraspique)

Planta anual con tallos erguidos terminados en densos corimbos de flores blancas o algo rosadas, con los pétalos exteriores más grandes, dando frutos disciformes alados. Aparece discretamente extendida por los campos de secano y sus alrededores.

48. **ISATIS tinctoria** L. (Hierba pastel, añil)

Hierba bastante elevada y muy ramosa, caracterizada sobre todo por sus frutos alados en forma de espátula. Ha sido cultivada en el pasado como planta tintórea, para obtener tonos azulados. Hoy día quedan algunas poblaciones residuales asilvestradas que viven en terrenos baldíos y márgenes de caminos.

49-51. **LEPIDIUM campestre** (L.) R. Br. (Mastuerzo silvestre)

Hierba anual de pequeñas flores blancas y frutos lenticulares cubiertos de pequeños tubérculos blancos. Interviene en herbazales más o menos nitrófilos, junto con algunos congéneres similares, como **L. draba** L. (el mastuerzo oriental) o **L. sativum** L. (el mastuerzo común)

52-53. **LEPIDIUM hirtum** (L.) Sm.

Otros mastuerzos, como éste y **L. heterophyllum** Benth, se diferencian por su carácter perenne y su mayor pelosidad, apareciendo en herbazales subnitrófilos secos o con mayor frecuencia en claros degradados de matorrales y pastizales vivaces.

54. **LEPIDIUM latifolium** L. (Mastuerzo silvestre mayor)

Hierba perenne, bastante más elevada y robusta que las anteriores y que habita en bosques ribereños y en los junciales instalados por los márgenes de ríos y arroyos.

55. **LEPIDIUM subulatum** L.

Pequeño arbusto, de hojas muy estrechas y agudas, muy especializado ecológicamente, adaptado a la vida en los matorrales secos, y habitualmente muy degradados, que se instalan en terrenos ricos en yeso, apareciendo extendido por las zonas yesíferas de las partes septentrionales de la comarca.

56. **LUNARIA annua** L. (Lunaria)

Hierba bienal, con grandes hojas jugosas y glabrescentes, que forma flores de color lila y grandes frutos disciformes que dejan un tabique blanquecino nacarado de acusado efecto ornamental. Se cultiva por ello en jardines y macetas, pudiendo observarse algún ejemplar naturalizado en escombros y márgenes de caminos por los alrededores de las poblaciones.

57. **MALCOMIA africana** (L.) R. Br.

Hierba anual, completamente tapizada de pelos estrellados aplicados, que le confieren un tono grisáceo, con pequeñas flores de color malva. Como su nombre sugiere es planta termófila, que apenas alcanza a presentarse en la comarca si no es en sus partes más secas y menos elevadas del extremo norte, donde puede verse en campos de secano y terrenos baldíos.

58. **MATTHIOLA fruticulosa** (L.) Maire

Planta perenne, algo leñosa en la base, con flores de color ocre o algo rosado. Como la anterior es una especie propia de terrenos secos y no muy frescos, que se desarrolla en matorrales y pastos vivaces soleados.

59. **MYAGRUM perfoliatum** L. (Piques grandes)

Hierba anual bastante robusta, provista de flores amarillas y frutos en forma de maza o guitarra. Aparece en ocasiones como mala hierba de campos de regadío, pasando a los secanos en años lluviosos.

60. **NESLIA paniculata** (L.) Desv. (Tamarillas)

Hierba anual muy erguida, con pequeñas flores amarillas y frutos globosos indehiscentes. Resulta frecuente por la comarca como mala hierba de los campos cerealistas de secano y herbazales nitrófilos de su entorno.

61. **RAPHANUS sativus** L. (Rábano común)


Hierba bienal bastante robusta, con frutos cónicos carnosos. Se cultiva en los huertos, por sus raíces comestibles, pudiendo observarse en ocasiones ejemplares asilvestrados en herbazales nitrófilos por los alrededores de los mismos.

62. **RAPISTRUM rugosum** (L.) All.

Caracterizada por sus frutos en forma de maza, con un cuerpo basal largo y estrecho y ensanchado en el ápice en un cuerpo esférico estriado. Se encuentra bastante extendida por herbazales secos subnitrófilos y como mala hierba de los campos de secano.

63-64. **RORIPPA aspera** (L.) Maire

Hierba perenne, con flores amarillas y frutos arqueados no muy alargados. Se presenta en prados húmedos y juncuales que bordean los ríos, arroyos y lagunas, sobre suelos cenagosos. En suelos arenosos silíceos, no menos húmedos, aparecen también algunas poblaciones de **R. pyrenaica** (L.) Reichenb.



9. *Thlapi suffruticosum*, planta endémica de la provincia de Teruel y sus alrededores, mostrando la característica heteromorfía de sus hojas.

65. **RORIPPA nasturtium-aquaticum** (L.) Hayek (Berros)

Diferenciada de las anteriores por sus flores blancas y sus hojas divididas en segmentos redondeados y jugosos, que resultan comestibles. Aparece parcialmente sumergida en aguas remansadas o de curso lento por toda la zona.

66-67 **SINAPIS alba** L. (Mostaza blanca)

Hierba anual de flores blancas y frutos cónicos terminados en largo pico. Sus semillas picantes han sido empleadas desde antiguo para la obtención de la mostaza, apareciendo asilvestrada en ocasiones en algunos herbazales nitrófilos. Más frecuente resulta la *S. arvensis* L. (mostaza silvestre), con flores amarillas y relativamente extendida como mala hierba de los campos de secano.

68-69 **SISYMBRIUM crassifolium** Cav.

Hierba bienal glabra y relativamente elevada, con flores amarillentas y largos frutos estrechamente cilíndricos. Resulta habitual en los campos de secano y márgenes de caminos, siendo sustituida en terrenos baldíos o herbazales menos trastocados por **S. laxiflorum** Boiss., más grácil y menos robusta.

70-72. **SISYMBRIUM irio** L. (Matacandil)

Hierba anual, con flores amarillas muy pequeñas y frutos muy estrechos. Aparece muy extendida por todo tipo de herbazales marcadamente nitrófilos, sobre todo en las poblaciones y alrededores de corrales y casas de campo. A veces se ve sustituido por **S. runcinatum** Lag., de porte rastrero, en las zonas bajas; o por **S. officinale** (L.) Scop., muy ramoso y con frutos aplicados al tallo, en zonas sombreadas.

73-74. **SISYMBRIUM orientale** L.

Se diferencia de sus congéneres por sus largos frutos, que se disponen de modo patente o algo colgantes. Aparece extendido por la comarca en campos de secano, márgenes de caminos o terrenos baldíos. Se ve sustituido por **S. macroloma** Pomel en las zonas frescas y sombreadas de montaña, una forma perenne y muy robusta, que llega a alcanzar dos metros de estatura, con frutos colgantes de 2-3 decímetros.

75-76. **TEESDALIA coronopifolia** (J.P. Bergeret) Thell

Hierba anual muy tenue y enana, provista de una pequeña roseta de hojas divididas y un escapo con un racimo de flores blancas que dan frutos lenticulares alados en el margen. Es planta característica de los pastizales efímeros primaverales que se instalan sobre suelos silíceos muy arenosos. En las áreas más húmedas llega a verse sustituida por **T. nudicaulis** (L.) R. Br., de área de distribución predominantemente atlántica.

77-78. **THLASPI arvense** L. (Carraspique, telaspíos)

Hierba anual glabra, con hojas abrazadoras y flores blancas, dando frutos disciformes muy alados en el margen. Habita en campos de cultivo, que pueden ser de ragadío o secanos húmedos de montaña. En pedregales y claros de matorrales sombreados se ve sustituida por **T. perfoliatum** L., de aspecto muy parecido pero menos robusta.

79. **THLASPI suffruticosum** Asso

Bien diferenciada de las anteriores por su carácter de hierba perenne, sus flores de color lila y sus hojas heteromorfas: las basales con limbo redondo tras largo peciolo y las superiores sentadas y lanceoladas. Planta endémica iberolevantina que aparece en la zona formando parte de pastizales vivaces sobre terrenos rocosos o pedregosos, tanto calizos como silíceos.